

ABORTO	6 mesi dall'evento
AFFEZIONI gastrointestinali,epatiche,urogenitali,ematologighe,immunologiche,renali,metaboliche,respiratorie	esclusione se affezione attiva,cronica o recidivante
AGOPUNTURA	nessuna (se effettuata con aghi monouso) altrimenti 4 mesi
ALCOOLISMO	definitiva
ALLERGIA - <i>a farmaci</i> - <i>stagionale</i> - <i>vaccini desensibilizzanti</i>	- due mesi dall'episodio - durata - 3 giorni dall'ultima dose
ALTERAZIONI ELETTROCARDIOGRAFICHE	-da valutarsi con cardiologo AVS
ASBESTOSI	definitiva
ASMA CRONICA (in trattamento)	definitiva
AUTOIMMUNITA' (malattie autoimmuni)	definitiva
BPCO	definitiva
BRUCELLOSI	due anni dalla guarigione
BABEBIOSI	definitiva
CARDIOPATIA ISCHEMICA	definitiva
COMPORTEMENTI SESSUALI - <i>cambio partner (partner stabile)</i> - <i>partner occasionale</i> - <i>partner affetto od a rischio di HIV-HBV-HCV</i> - <i>comportamenti sessuali ad alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili con sangue</i>	- quattro mesi da inizio relazione sessuale - quattro mesi dall'ultima esposizione al rischio - quattro mesi dal termine del rapporto - definitiva
CONTATTI CON MALATTIE ESANTEMATICHE	Quattro settimane
CONVIVENZA CON PORTATORI DI EPATITE - <i>epatite B</i> - <i>epatite C</i> <i>Donatori partner o conviventi di soggetti con sierologia con positività aspecifica</i>	- sospensione fino a 4 mesi dalla fine convivenza -sospensione fino a 4 mesi dalla fine convivenza -idoneità
DIABETE MELLITO	- sospensione definitiva per diabete insulino dipendente -idoneità se forme compensate solo con dieta e valori glicemia basale < 130 mg/dl) - idoneità se in terapia con antidiabetici orali, se in buon compenso glicemico ed esclusi danni d'organo (previa visione da parte del medico AVIS di documentazione del Centro antidiabetico)
DENTISTA - CURE ODONTOIATRICHE - <i>ablazione tartaro ,otturazioni</i> <i>-se presente ferita (es. estrazione, implantologia)</i>	- 2 giorni - una settimana dalla guarigione della ferita

DIFETTI CARDIACI (es. DIV, ANCHE SE CORRETTI CHIRURGICAMENTE)	- definitiva
Ad eccezione: DIA CORRETTO CHIRURGICAMENTE PFO	- da valutare con consulenza cardiologica AVIS -da valutare con consulenza cardiologica AVIS
DROGA - leggera (solo h e m) - pesante	- sei mesi dallo stop assunzione - definitiva se per via parenterale o tossicodipendenza -riammissione dopo un anno dallo stop consumo, solo per droghe chimiche o cocaina, se uso sporadico (inteso come a volte e non protratto per un tempo determinato)
ECOGRAFIA TRANSLUMINALE	idoneo
ENDOSCOPIA	quattro mesi
EPATITE A EPATITE B anche pregressa EPATITE C EPATITE da eziologia indeterminata	- 4 mesi dalla guarigione - definitiva - definitiva - definitiva
EPILESSIA	definitiva- ad eccezione convulsioni febbrili in età pediatrica (1 solo episodio isolato- no terapia a lungo termine)
ESPIANTO DI MIDOLLO (donazione di sangue midollare o di cellule staminali da sangue perif.)	Un anno
FARMACI - antiinfiammatori FANS - antibiotici orali - antibiotici parenterali - antidepressivi - cortisonici - antistaminici - H2 bloccanti / inibitori pompa protonica - ansiolitici / ipnoinduttori - eparina - finasteride - dutasteride - antagonisti recettori alfa - statine - terapia ormonale sostitutiva per menopausa - estroprogestinici orali - ormoni tiroidei - beta bloccanti - acitretina (Neo Tigason) - altri retinoidi (Roaccutan) - utilizzo anche pregresso, per via I.M-E.V, di steroidi anabolizzanti o EPO (doping) -venoprotettori (es.diosmina)	- 5-7 giorni (se assunti per algie isolate: idonei - donazioni feriali: segnalazione NO PLT) - 15 giorni - 30 giorni - 30 giorni - 15 giorni - 10 giorni - 5 giorni - 3-7 giorni - 90 giorni - 60 giorni -180 giorni - 5 giorni - 5 giorni - nessuna sospensione - nessuna sospensione - definitiva se pat. autoimmune pluriorgano -esclusione aspirante; definitiva per donatore periodico che inizia la terapia; nessuna per donatore periodico già in terapia da diversi anni, sospensione se episodi vaso-vagali post donazione. - un anno - 1 mese - definitiva - 5 giorni
FEBBRE > 38 C°	due settimane dopo la cessazione dei sintomi
INFARTO MIocardico ACUTO - ANGINA	definitiva

<p>-INTERVENTI CHIRURGICI (in anestesia generale o spinale)</p> <p>- INTERVENTI CHIRURGICI CON TRASFUSIONI AUTOLOGHE O OMOLOGHE</p> <p>- INTERVENTI CHIRURGICI IN AN. LOCALE</p>	<p>-quattro mesi (ad eccezione taglio cesareo: 6 mesi)</p> <p>- quattro mesi, compatibilmente con la patologia di fondo</p> <p>- un mese (previa visione es. istologico se eseguito su neoformazioni)</p>
<p>INTERVENTI OCULISTICI CON LASER (CORREZIONE MIOPIA, CATARATTA SENILE)</p>	<p>due mesi (fine trattamento con collirio per tono oc.)</p>
<p>MALARIA (malattia)</p>	<p>- idoneità , 6 mesi dopo la guarigione, previa esecuzione di Ab vs malaria, oppure solo plasmaferesi</p>
<p>MALATTIE INTESTINALI CRONICHE (CROHN, RETTOCOLITE ULCEROSA)</p>	<p>definitiva</p>
<p>MESTRUAZIONI</p>	<p>idoneità se non dismenorrea o menorragia</p>
<p>MONONUCLEOSI</p>	<p>sei mesi dalla guarigione</p>
<p>PARTO</p>	<p>sei mesi</p>
<p>PIERCING</p>	<p>quattro mesi</p>
<p>TATUAGGI-TRUCCO PERMANENTE</p>	<p>quattro mesi</p>
<p>TUBERCOLOSI</p>	<p>due anni dalla guarigione</p>
<p>VACCINAZIONI</p> <p>- vaccini vivi o attenuati (BCG, antipolio orale (Sabin), antivaaiolo, antimorbillo, antiparotite, antirosolia, antifebbre gialla, antitifica)</p> <p>- vaccini uccisi, inattivati, tossoidi (antiepatite A, antitetanica, antiinfluenzale, antipolio parenterale - Salk-, antirabbia -profilassi-, antimeningococco, antipneumococco)</p> <p>- Vaccino anti epatite B</p> <p>- vaccino anti rabbia dopo morso di animale</p>	<p>- quattro settimane</p> <p>- 48 ore se apiressia</p> <p>-7 giorni</p> <p>- 7 giorni</p>